

Bestandesführung Winterroggen

Maßnahmen		BRASETTO	PALAZZO	EOLO	DUKATO	MARCELO	NIKITA
Sortentyp:		Hybrid	Hybrid	Hybrid	Populationsroggen	Populationsroggen	Populationsroggen
Saatzeit:		Ende September bis Mitte Oktober In raueren Lagen, auf schwächeren Standorten ist der frühere Zeitpunkt vorzuziehen					
Saatstärke:	Körner/m ²	250 - 275	250 - 275	250 - 275	300 - 350	300 - 350	300 - 350
ca. kg/ha	je nach TKG	3 Packungen/ha *	3 Packungen/ha *	75 - 100	120 - 145	120 - 145	120 - 145
N-Düngung:		Cross Compliance Vorschriften beachten. Die N-Obergrenzen sind abhängig von der Ertragserwartung (CC und UBAG). Aufteilung in 2 Frühjahrsgaben hat sich bewährt !					
1. Gabe in kg/ha	zu Vegetationsbeginn	50 - 60	50 - 60	50 - 60	40 - 50	40 - 50	40 - 50
2. Gabe in kg/ha	Beginn des Schossens	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40
Standfestigkeit:	Einstufung AGES	4	3	5	4	6	6
Wachstumsregler:		Bei sehr hoher Ertragserwartung und sehr üppigen Beständen Achtung auf Temperatur bei Anwendung - je wärmer, umso stärker der Einkürzungseffekt ! Stabilanmengen > 1,2 l/ha splitten, wenn zweite Einkürzung notwendig eventuell mit Moddus (bis EC 49 möglich) oder Camposan Extra					
l/ha CCC bei 400g Wirkstoff: EC 30 - 37		1,5 - 3	1,5 - 3	2 - 3	2 - 3	3 - 4	3 - 4
l/ha CCC bei 720g/l Wirkstoff		1 - 1,5	1 - 1,5	1 - 2	1 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
l/ha Moddus: EC 32 - 49		0,2 - 0,4	0,2 - 0,4	0,3 - 0,5	0,3 - 0,5	0,3 - 0,6	0,3 - 0,6
l/ha Camposan Extra: EC 37 - 49		0,4 - 0,6	0,4 - 0,6	0,5 - 0,8	0,5 - 0,8	0,7 - 1,1	0,7 - 1,1
l/ha Medax Top: EC 30 - 39		0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	0,6 - 0,9	0,6 - 0,9	1 - 1,5	1 - 1,5
Pflanzenschutz		Bei Herbiziden und Fungiziden Zulassungsbestimmungen beachten !					
	Unkraut	Roggen hat eine geringere Herbizidverträglichkeit als z.B. Weizen Auf die Wahl des Zeitpunktes und der Mittel ist besonderer Wert zu legen ! Herbstbehandlungen ist der Vorzug zu geben, da Roggen im Frühjahr sehr zeitig zu wachsen beginnt und sehr rasch EC 31 - 32 überschritten ist !					
Blattkrankheiten	Mehltau AGES	5	5	6	6	4	5
	Braunrost AGES	6	7	5	5	5	7
	Abreifeschutz	Ab EC 37 (Erscheinen des letzten Blattes) ist insbesondere der Braunrostbefall zu beachten und bis längstens EC 49 (Öffnen der letzten Blattscheide) eine Fungizidmaßnahme zu setzen ! Mehltau und Braunrost haben in den letzten Jahren, insbesondere bei Hybridsorten zunehmende Bedeutung erlangt und rechtfertigen in allen Anbaulagen eine Behandlung !					
Reifezeit	Einstufung AGES	mittelspät (7)	mittelspät (7)	mittelspät (7)	mittel (6)	mittel (6)	mittelfrüh (5)

* 850.000 Körner/Packung